



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE DERECHOS SOCIALES, CONSUMO
Y AGENDA 2030

SECRETARÍA DE ESTADO
DE DERECHOS SOCIALES



Centro de
Referencia
Estatad de
Atención
Psicosocial

SERVICIO DE REFERENCIA INFORMACIÓN Y CONSULTA

«Intervención psicosocial en
TMG. Patologías y variables
sociodemográficas del TMG. El
papel de la familia.»

Informe a 15 de marzo de 2024

Índice

ÍNDICE	1
CONSULTA BIBLIOGRÁFICA Y FUENTES DE INFORMACIÓN CONSULTADAS	2
RESULTADOS DE LA BÚSQUEDA BIBLIOGRÁFICA	3
ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA DE LITERATURA CIENTÍFICA	19

Consulta bibliográfica y fuentes de información consultadas

Asunto central de la búsqueda: Impacto de la intervención psicosocial en personas con trastorno mental grave (TMG). Patologías de TMG con más investigación. Variables sociodemográficas más estudiadas en personas con trastorno mental grave. El papel de la familia en el TMG.

Ámbito profesional o interés particular: Ámbito profesional.

Área de especialización profesional: Trabajo Social.

Idiomas: Castellano, inglés.

Periodo (en años): 2019-2024 (último cinco años).

Fecha de elaboración del informe: 15 de marzo de 2024.

Fuentes de información consultadas:

- Web of Science
- Pubmed
- Cochrane
- Otras fuentes oficiales.

Resultados de la búsqueda bibliográfica

LITERATURA CIENTÍFICA

Título	Understanding family carer experiences and perceptions of engagement in delirium prevention and care for adults in hospital: Qualitative systematic review
Autoría	Karen Lee-Steere, Alison Mudge, Jacki Liddle, Sally Bennett
Publicación	J Clin Nurs. 2024 Apr;33(4):1320-1345.
Resumen/Objetivo	Objetivo: Identificar, describir y sintetizar lo que se conoce sobre las experiencias y perspectivas de los cuidadores familiares en relación con la participación en la prevención y atención del delirio en adultos hospitalizados.

Título	Demographic, biochemical, clinical, and cognitive symptom differences between smokers and non-smokers in Chinese older male patients with chronic schizophrenia
Autoría	Wei Li, Ling Yue, Shifu Xiao
Publicación	Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci. 2024 Mar 10.
Resumen/Objetivo	Antecedentes: Varios estudios han sugerido que fumar puede deteriorar la función cognitiva y empeorar los síntomas psiquiátricos en personas con esquizofrenia, pero los resultados no han sido consistentes. Hasta la fecha ha habido pocos estudios que hayan examinado los efectos del tabaquismo en hombres mayores con esquizofrenia crónica.

Título	Interventions for psychiatric disorders among university students: An umbrella review of systematic reviews and meta-analyses
Autoría	Huan Huang, Shaofen Huang, Shiyun Chen, Xuping Gao, Jun Cai, Yonghui Feng, Jiazi Liu, Xin Su, Jiamin Qiu, Shiwen Zhang, Ying Xu, Zheng Liu, Ting Wang, Fangfang Zeng
Publicación	Int J Clin Health Psychol. 2024 Jan-Mar;24(1):100431.
Resumen/Objetivo	Los trastornos mentales se consideran la principal causa del aumento de la carga de morbilidad. Los estudiantes universitarios parecen ser más vulnerables a los efectos adversos del estrés, lo

	que los hace más propensos a padecer trastornos mentales. Esta revisión general tuvo como objetivo evaluar la credibilidad de las pruebas publicadas con respecto a los efectos de las intervenciones sobre los trastornos mentales entre los estudiantes universitarios.
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Título	The effectiveness of physical activity interventions that include both physical activity and psychosocial strategies in people living with a severe mental illness: a systematic review and meta-analysis
Autoría	Annaleise Naylor, Andrew Flood, Richard Keegan
Publicación	International Review of Sport and Exercise Psychology. 2024 Feb 1.
Resumen/Objetivo	Las personas con una enfermedad mental grave corren un mayor riesgo de no cumplir las directrices de actividad física. Este estudio tiene como objetivo identificar y describir la influencia de una intervención de actividad física que incluye tanto la actividad física y estrategias psicosociales, en el comportamiento de la actividad física en una población que vive con una enfermedad mental grave.

Título	Contribution of socio-demographic and clinical characteristics to predict initial referrals to psychosocial interventions in patients with serious mental illness
Autoría	Guillaume Barbalat, Julien Plasse, Isabelle Chéreau-Boudet, Benjamin Gouache, Emilie Legros-Lafarge, Catherine Massoubre, Nathalie Guillard-Bouhet, Frédéric Haesebaert, Nicolas Franck
Publicación	Epidemiol Psychiatr Sci. 2024 Jan 29:33:e2.
Resumen/Objetivo	Objetivos: La rehabilitación psicosocial es el núcleo de la recuperación psiquiátrica. Hay una escasez de pruebas sobre cómo las necesidades y características de los pacientes guían las decisiones clínicas para derivarlos a intervenciones de rehabilitación psicosocial. En este estudio se utilizaron métodos de aprendizaje automático explicable para determinar cómo las características sociodemográficas y clínicas contribuyen a las derivaciones iniciales a intervenciones de rehabilitación psicosocial en pacientes con enfermedades mentales graves.

Título	What to do when the unwanted happens? Negative event management in studies on internet- and mobile-based interventions for youths and adults with two case reports
Autoría	Christina Schulte, Theresa Sextl-Plötz, Harald Baumeister, Ingrid

	Titzler, Lasse B Sander, Cedric Sachser, Lena Steubl, Anna-Carlotta Zarski
Publicación	Internet Interv. 2024 Jan 24:35:100710.
Resumen/Objetivo	El objetivo de este estudio es ilustrar la evaluación, el seguimiento y los procedimientos para abordar las nee en dos estudios sobre intervenciones basadas en Internet y en dispositivos móviles en adultos y jóvenes mediante informes de casos, identificar los puntos fuertes y débiles de los enfoques de gestión de los eventos negativos y extraer aprendizajes y recomendaciones clave.

Título	Current practices of psychoeducation interventions with persons with bipolar disorders: a literature review
Autoría	Vanessa Levrat, Sophie Favre, Hélène Richard-Lepouriel
Publicación	Front Psychiatry. 2024 Jan 5:14:1320654.
Resumen/Objetivo	Esta revisión buscó resumir la literatura sobre las prácticas y formas actuales de psicoeducación en el manejo de pacientes con trastorno bipolar (TB), incluyendo sólo ensayos controlados aleatorios para asegurar el mejor nivel de evidencia. Se realizó una revisión exhaustiva de la literatura disponible utilizando las bases de datos PubMed/MEDLINE, Embase y PsychInfo desde el inicio hasta el 28 de abril de 2022. La búsqueda arrojó 381 estudios. Se incluyeron 70 artículos tras eliminar los duplicados y aplicar los criterios de inclusión/exclusión. Se utilizó una síntesis de la mejor evidencia para identificar los resultados clave de cada estudio y resumir los resultados. Se establecieron once categorías descriptivas. Abarcan diferentes formas de psicoeducación comparadas o combinadas con otras intervenciones psicosociales, que varían en el entorno (individual o grupal), con o sin miembros de la familia, estructuradas o no estructuradas, mediadas o no por herramientas digitales (smartphone, internet). Globalmente, estos estudios muestran que la psicoeducación es importante en el tratamiento de la EB, ya que conduce a una disminución de las recaídas, episodios del estado de ánimo, hospitalizaciones y mejora del funcionamiento o calidad de vida.

Título	A systematic review of the effectiveness and implementation readiness of psychosocial interventions for psychosis in South Asia
Autoría	Sophie Lyles, Zahra Khan, Onaiza Qureshi, Madiha Shaikh
Publicación	PLoS One. 2023 Nov 2;18(11):e0283411.

Resumen/Objetivo	Se sabe poco sobre la eficacia y la aplicación de las intervenciones psicosociales para la psicosis en los países de ingresos bajos y medios (PIBM). En el sur de Asia, los recursos psiquiátricos especializados son escasos. El apoyo a la psicosis suele recaer en la familia o el cuidador, lo que puede aumentar la sensación de carga, afectar al bienestar de los cuidadores y aumentar el estigma de la salud mental. Las intervenciones psicosociales se utilizan cada vez más para la psicosis en el sur de Asia y podrían reducir las recaídas y los síntomas, reducir la carga de los cuidadores, conservar los costes y los recursos. El objetivo de esta revisión fue evaluar la efectividad y la disposición para la implementación de las intervenciones psicosociales para las personas con psicosis en el sur de Asia.
-------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Título	Protocol for a scoping review of the role of siblings in supporting middle-aged and older people with early-acquired severe mental illness
Autoría	Jialiang Cui, Siyuan Guo, Wan Sang Kan, Lin Zhang, Xin He, Renxing Chen, Na Chen, Kangwei Xun
Publicación	BMJ Open. 2023 Oct 21;13(10):e076645.
Resumen/Objetivo	Para las personas mayores que desarrollaron una enfermedad mental grave (EMG) durante la adolescencia tardía o la edad adulta temprana (denominada EMG adquirida precozmente), la combinación de envejecimiento y EMG presenta retos sanitarios y psicosociales persistentes. Este grupo, con una mayor probabilidad de no estar casado o de experimentar la disolución del matrimonio, a menudo carece de recursos sociales y económicos para hacer frente a las dificultades a las que se enfrentan en la edad adulta. En los últimos años, ha crecido el interés por comprender el papel de los hermanos en el apoyo al proceso de envejecimiento de los individuos con EMG adquirido precozmente. Sin embargo, hasta la fecha, ninguna revisión ha investigado el papel de los hermanos en la asistencia a sus hermanos o hermanas de mediana edad y mayores con EMG a medida que envejecen en contextos comunitarios. Nuestra revisión del alcance pretende explorar y sintetizar la literatura existente sobre el apoyo de los hermanos a las personas con EMG adquirido precozmente, con el objetivo de informar sobre nuevos avances en la investigación, la práctica y la política.

Título	Psychosocial interventions for survivors of rape and sexual assault experienced during adulthood
---------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Autoría	Lorna O'Doherty, Maxine Whelan, Grace J Carter, Katherine Brown, Laura Tarzia, Kelsey Hegarty, Gene Feder, Sarah J Brown
Publicación	Cochrane Database Syst Rev. 2023 Oct 5;10(10):CD013456.
Resumen/Objetivo	Evaluar los efectos de las intervenciones psicosociales sobre la salud mental y el bienestar de los supervivientes de violaciones, agresiones sexuales o abusos sexuales sufridos durante la edad adulta.

Título	Gender and addiction and other mental disorders comorbidity: sociodemographic, clinical, and treatment differences
Autoría	Silvia Díaz Fernández, Juan José Fernandez Miranda, Francisco Pascual Pastor, Francisco López Muñoz
Publicación	Arch Womens Ment Health. 2023 Oct;26(5):639-650.
Resumen/Objetivo	Se supone que la co-ocurrencia de trastornos por uso de sustancias (TUS) y otros trastornos mentales (OTM) es elevada, pero los detalles son inciertos en España. El objetivo del presente estudio fue conocer la prevalencia de esta comorbilidad, así como el tratamiento farmacológico, tanto en redes específicas de tratamiento de adicciones como en redes de salud mental, con una perspectiva de género. Estudio observacional, multicéntrico, con una muestra aleatorizada, de pacientes en tratamiento por TUS u OTM en España (N = 1783). Los clínicos tratantes cumplimentaron un cuestionario específico que recogía variables sociodemográficas y clínicas, TUS y OTM diagnosticados y psicofármacos prescritos. Se buscaron diferencias entre mujeres y varones. Se encontró una alta prevalencia de OTM en los pacientes tratados por su TUS (71%), y también de diagnósticos de TUS (59%) en las personas tratadas por OTM.

Título	A 1-Day Training Course to Disseminate the BREF Psychoeducational Program to Caregivers and Promote Network Establishment between Psychiatry Departments and Family Associations
Autoría	Romain Rey, Bénédicte de Martène, Matias Baltazar, Marie-Maude Geoffray, Thierry d'Amato, Caroline Demily, Anne-Lise Bohec
Publicación	Acad Psychiatry. 2023 Oct;47(5):496-503.
Resumen/Objetivo	Aunque las directrices internacionales establecen que la psicoeducación a los cuidadores debe proporcionarse de forma sistemática, sigue estando insuficientemente disponible en psiquiatría. Este estudio informa sobre el desarrollo y la evaluación de un curso de formación original destinado a proporcionar a los

	participantes los conocimientos y habilidades para implementar "BREF", un programa psicoeducativo para cuidadores.
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Título	Psychosocial and behavioural interventions for the negative symptoms of schizophrenia: a systematic review of efficacy meta-analyses
Autoría	Matteo Cella, Safina Roberts, Matthias Pillny, Marcel Riehle, Brian O'Donoghue, John Lyne, Paul Tomlin, Lucia Valmaggia, Antonio Preti
Publicación	Br J Psychiatry. 2023 Jul;223(1):321-331.
Resumen/Objetivo	Objetivo: Revisar y evaluar las pruebas de estudios metaanalíticos de intervenciones psicosociales y conductuales para los síntomas negativos de la esquizofrenia.

Título	"I wanted to hide but also to be found": the high school experiences of young adults who grew up in the same home as a sibling with depression
Autoría	Inbar Levkovich, Michal Labes
Publicación	BMC Psychol. 2023 Jun 29;11(1):190.
Resumen/Objetivo	La depresión es un trastorno de salud mental que puede tener consecuencias de largo alcance para toda la familia, no sólo para el individuo afectado. Los hermanos son especialmente vulnerables, ya que el estrés y la culpa incesantes en casa pueden afectar a múltiples aspectos de sus vidas, como las relaciones, las responsabilidades añadidas y la salud. Esta presión puede afectar al propio bienestar emocional y al éxito académico de los hermanos. La mayoría de los estudios en este campo han examinado el impacto de la depresión en los adolescentes afectados o en sus padres, mientras que pocos han examinado el impacto en los hermanos. Los estudios sobre hermanos se han visto limitados por la falta de homogeneidad de la muestra, especialmente en el contexto del afrontamiento en la escuela secundaria. Este estudio trató de examinar las experiencias retrospectivas de los adultos jóvenes que vivían en la misma casa que un hermano con depresión mientras estaban en la escuela secundaria.

Título	Dog-assisted interventions for adults diagnosed with schizophrenia and related disorders: a systematic review
Autoría	Malene Kalsnes Tyssedal, Erik Johnsen, Aurora Brønstad, Silje Skrede

Publicación	Front Psychiatry. 2023 Jun 23;14:1192075.
Resumen/Objetivo	Muchos individuos diagnosticados de esquizofrenia y trastornos relacionados experimentan un alivio insuficiente de los síntomas con las opciones de tratamiento actualmente disponibles. Debe priorizarse la investigación de vías adicionales. Esta revisión sistemática, diseñada de acuerdo con PRISMA, examinó el efecto de las intervenciones dirigidas y estructuradas asistidas con perros como tratamiento complementario.

Título	The effect of exercise on global, social, daily living and occupational functioning in people living with schizophrenia: A systematic review and meta-analysis
Autoría	Nicole Korman, Robert Stanton, Anna Vecchio, Justin Chapman, Stephen Parker, Rebecca Martland, Dan Siskind, Joseph Firth
Publicación	Schizophr Res. 2023 Jun;256:98-111.
Resumen/Objetivo	Esta revisión tuvo como objetivo actualizar la base de pruebas con respecto al impacto del ejercicio sobre el funcionamiento en la esquizofrenia, y explorar los moderadores del efecto.

Título	Social and occupational recovery in early psychosis: a systematic review and meta-analysis of psychosocial interventions
Autoría	E Frawley, M Cowman, M Lepage, G Donohoe
Publicación	Psychol Med. 2023 Apr;53(5):1787-1798.
Resumen/Objetivo	La psicosis, incluso en sus estadios iniciales, ocupa un lugar destacado entre las causas de discapacidad en todo el mundo, lo que da lugar a una mayor atención a la mejora de la recuperación del funcionamiento social y laboral. Este estudio pretendía proporcionar una estimación de la efectividad de las intervenciones psicosociales para mejorar el funcionamiento en la psicosis temprana. También se buscaron pruebas de superioridad entre los enfoques de intervención.

Título	Efficacy and acceptability of psychosocial interventions in schizophrenia: systematic overview and quality appraisal of the meta-analytic evidence
Autoría	Marco Solmi, Giovanni Croatto, Giada Piva, Stella Rosson, Paolo Fusar-Poli, Jose M Rubio, Andre F Carvalho, Eduard Vieta, Celso Arango, Nicole R DeTore, Elizabeth S Eberlin, Kim T Mueser, Christoph U Correll

Publicación	Mol Psychiatry. 2023 Jan;28(1):354-368.
Resumen/Objetivo	Las intervenciones psicosociales se recomiendan en la esquizofrenia y en el primer episodio de psicosis/psicosis temprana (PE). Sin embargo, la literatura es heterogénea y a menudo contradictoria. Se realizó una revisión general de metanálisis (en red) de ensayos controlados aleatorios (ECA) que compararon las intervenciones psicosociales con el tratamiento habitual (TAU)/intervenciones activas (ACTIVE)/controles mixtos.

Título	Mental healthcare in primary and community-based settings: evidence beyond the WHO Mental Health Gap Action Programme (mhGAP) Intervention Guide
Autoría	Roxanne C Keynejad, Jessica Spagnolo, Graham Thornicroft
Publicación	Evid Based Ment Health. 2022 Dec;25(e1):e1-e7.
Resumen/Objetivo	La Guía de intervención del Programa de acción para superar las brechas en salud mental (mhGAP-IG) de la OMS se ha utilizado ampliamente en países de ingresos bajos y medios. Se revisó la literatura que describe las intervenciones y los programas de formación más allá de la mhGAP-IG, en la atención primaria de salud (APS) y la atención comunitaria de salud (CBH).

Título	Hybrid and Remote Psychosocial Interventions Focused on Weight and Sedentary Behavior Management Among Patients with Severe Mental Illnesses: a Systematic Review
Autoría	Ana Cecília Novaes Oliveira, Suzana Maria Menezes Guariente, Robson Zazula, Arthur Eumann Mesas, Carlos Eduardo Coral Oliveira, Edna Maria Vissosi Reiche, Sandra Odebrecht Vargas Nunes
Publicación	Psychiatr Q. 2022 Sep;93(3):813-840.
Resumen/Objetivo	El objetivo de esta revisión sistemática fue evaluar la eficacia de los estudios que utilizaron tecnologías digitales para reducir el peso, el índice de masa corporal (IMC) y la circunferencia abdominal en individuos con enfermedades mentales graves.

Título	Cognitive behavioural therapy (group) for schizophrenia
Autoría	Giuseppe Guaiana, Massimiliano Abbatecola, Ghazaleh Aali, Federica Tarantino, Ikenna D Ebuonyi, Valeria Lucarini, Wei Li, Caidi Zhang, Antonio Pinto

Publicación	Cochrane Database Syst Rev. 2022 Jul 12;7(7):CD009608.
Resumen/Objetivo	Investigar la eficacia y aceptabilidad de la TCC grupal aplicada a la psicosis en comparación con la atención estándar u otras intervenciones psicosociales, para personas con esquizofrenia o trastorno esquizoafectivo.

Título	Do psychological interventions reduce symptoms of depression for patients with bipolar I or II disorder? A meta-analysis
Autoría	Sakir Yilmaz, Anna Huguet, Steve Kisely, Sanjay Rao, JianLi Wang, Kayti Baur, Molly Price, Heather O'Mahen, Kim Wright
Publicación	J Affect Disord. 2022 Mar 15;301:193-204.
Resumen/Objetivo	Este metanálisis exploró la efectividad de las terapias psicológicas en la reducción de la depresión bipolar, en particular examinando si: (1) el efecto de la terapia es mayor cuando los síntomas depresivos basales son más graves, y (2) el efecto de la terapia es mayor cuando el objetivo principal de la terapia es el tratamiento de la depresión bipolar aguda.

Título	Evaluating family knowledge about sexual health in patients with severe mental illness: a qualitative study in Iran
Autoría	Zahra Mirsepassi, Firoozeh Raisi, Zahra Shahvari, Reihaneh FirooziKhojastefar, Seyyed Taha Yahyavi
Publicación	BMC Psychiatry. 2022 Mar 10;22(1):174.
Resumen/Objetivo	Este estudio pretende explorar los conocimientos de las familias sobre salud sexual en pacientes con enfermedades mentales graves en Irán.

Título	Schema Therapy for Patients with Bipolar Disorder: Theoretical Framework and Application
Autoría	Marie Ociskova, Jan Prasko, Krystof Kantor, Frantisek Hodny, Pavel Kasyanik, Michaela Holubova, Jakub Vanek, Milos Slepecky, Vlastimil Nesnidal, Kamila Minarikova Belohradova
Publicación	Neuropsychiatr Dis Treat. 2022 Jan 6;18:29-46.
Resumen/Objetivo	El trastorno bipolar (TB) es un trastorno grave del estado de ánimo caracterizado por episodios de depresión e hipomanía o manía. A pesar de sus raíces principalmente biológicas, el inicio y el curso del trastorno también se han relacionado con factores psicosociales

	como experiencias adversas tempranas y esquemas desadaptativos relacionados. Varios investigadores propusieron un modelo terapéutico de esquemas para tratar a los pacientes con TB. En este artículo, desarrollamos el modelo teórico y elaboramos siete elementos que se encontraron efectivos en las intervenciones psicosociales con individuos con TB.
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Título	Epidemiology and costs of depressive disorder in Spain: the EPICO study
Autoría	Eduard Vieta, Jordi Alonso, Víctor Pérez-Sola, Miquel Roca, Teresa Hernando, Antoni Sicras-Mainar, Aram Sicras-Navarro, Berta Herrera, Andrea Gabilondo
Publicación	Eur Neuropsychopharmacol. 2021 Sep;50:93-103.
Resumen/Objetivo	Los Trastornos Depresivos son los diagnósticos psiquiátricos más frecuentes en la población general. Para estimar la frecuencia, los costes asociados a los Trastornos Depresivos en la práctica clínica habitual, y en el conjunto de la población española, se realizó un estudio longitudinal, retrospectivo y observacional con datos de la base de datos BIG-PAC®.

Título	Perceived family cohesion, social support, and quality of life in patients undergoing treatment for substance use disorders compared with patients with mental and physical disorders
Autoría	Bente Birkeland, Bente Weimand, Torleif Ruud, Darryl Maybery, John-Kåre Vederhus
Publicación	Addict Sci Clin Pract. 2021 Jun 30;16(1):44.
Resumen/Objetivo	El apoyo de la familia y otros elementos de la red social puede ser importante para ayudar a los pacientes a hacer frente a las consecuencias prácticas y emocionales de las enfermedades. El objetivo del estudio fue examinar la percepción del apoyo familiar y social y la calidad de vida (CdV) en pacientes en tratamiento por trastornos por uso de sustancias (TUS). Los comparamos con pacientes en tratamiento por trastornos mentales (TM) y trastornos físicos (TF).

Título	Comparison of cognitive dysfunction between schizophrenia and bipolar disorder patients: A meta-analysis of comparative studies
Autoría	Wen Li, Fu-Chun Zhou, Ling Zhang, Chee H Ng, Gabor S Ungvari, Jun Li, Yu-Tao Xiang

Publicación	J Affect Disord. 2020 Sep 1:274:652-661.
Resumen/Objetivo	Objetivo: La disfunción cognitiva es común tanto en la esquizofrenia como en el trastorno bipolar. Este es un meta-análisis de estudios que compararon la disfunción cognitiva entre la esquizofrenia y el trastorno bipolar.

Título	Sleep, psychopathology and cultural diversity
Autoría	Tiffany Yip, Yuen Mi Cheon
Publicación	Curr Opin Psychol. 2020 Aug:34:123-127.
Resumen/Objetivo	Las disparidades en la salud mental reflejan las disparidades en el sueño y las minorías étnicas/raciales informan de una mayor prevalencia y luchas más graves. Esta revisión se centra en la investigación reciente sobre las disparidades en el sueño y la salud mental y considera la discriminación étnica/racial como una tercera variable importante que puede vincular estos dos ámbitos de la investigación sobre las disparidades. Por ejemplo, la investigación ha descubierto que la discriminación media en las disparidades étnicas/raciales en el sueño; al mismo tiempo, se ha observado que el sueño media en el vínculo entre la discriminación y la salud mental.

Título	Chronic smoking and cognition in patients with schizophrenia: A meta-analysis
Autoría	Nicolas Coustals, Catherine Martelli, Marine Brunet-Lecomte, Amélie Petillion, Bruno Romeo, Amine Benyamina
Publicación	Schizophr Res. 2020 Aug:222:113-121.
Resumen/Objetivo	Antecedentes: Los pacientes con esquizofrenia presentan una tasa de tabaquismo muy elevada en comparación con la población general. El objetivo del presente metaanálisis era evaluar la asociación entre el rendimiento cognitivo y el hábito de fumar en pacientes con esquizofrenia.

Título	Multidimensional impact of severe mental illness on family members: systematic review
Autoría	Wubalem Fekadu, Awoke Mihiretu, Tom K J Craig, Abebaw Fekadu
Publicación	BMJ Open. 2019 Dec 30;9(12):e032391.
Resumen/Objetivo	El impacto de las enfermedades mentales graves (EMG) no se limita a la persona que padece la enfermedad, sino que se extiende a los miembros de su familia y a la comunidad de la que procede el paciente. En esta revisión, analizamos sistemáticamente la

	evidencia disponible sobre el impacto de las EMG en los miembros de la familia, incluidos padres, abuelos, hermanos, cónyuges e hijos.
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Título	Psychosocial interventions for people with both severe mental illness and substance misuse
Autoría	Glenn E Hunt, Nandi Siegfried, Kirsten Morley, Carrie Brooke-Sumner, Michelle Cleary
Publicación	Cochrane Database Syst Rev. 2019 Dec 12;12(12):CD001088.
Resumen/Objetivo	Evaluar los efectos de las intervenciones psicosociales para la reducción del consumo de sustancias en personas con una enfermedad mental grave en comparación con la atención estándar.

OTROS ARTÍCULOS RELACIONADOS

Título	Características sociodemográficas y tendencia de los problemas de salud mental en España en las dos primeras décadas del siglo XXI
Autoría	Almudena Moreno, Lourdes Lostao, Enrique Regidor
Publicación	Panorama Social. 2023 Dec; 38
Resumen/Objetivo	En este trabajo se han utilizado los datos proporcionados por las encuestas de salud por entrevista de ámbito nacional, con el objetivo de estimar la evolución de la salud mental en la población española según diversas características sociodemográficas. En el caso del suicidio, se ha utilizado la información proporcionada por la estadística de defunciones según la causa de la muerte.

Título	The impact of humor therapy on people suffering from depression or anxiety: An integrative literature review
Autoría	Xuefeng Sun, Jindan Zhang, Yidan Wang, Xiaotu Zhang, Sixuan Li, Zihan Qu, Hongshi Zhang
Publicación	Brain Behav. 2023 Sep;13(9):e3108.
Resumen/Objetivo	Identificar y sintetizar las investigaciones existentes sobre la eficacia y viabilidad de la terapia del humor multiforme en personas que sufren depresión o ansiedad, con la esperanza de beneficiar a futuras investigaciones.

Título	Unraveling Reactionary Care: The Experience of Mother-Caregivers of Adults with Severe Mental Disorders in Catalonia
Autoría	Elisa Alegre-Agís, Andrea García-Santesmases, Asun Pié-Balaguer, Àngel Martínez-Hernández, Deborah Bekele, Nicolás Morales-Sáez, Mercedes Serrano-Miguel
Publicación	Cult Med Psychiatry. 2023 Sep;47(3):790-813.
Resumen/Objetivo	En la mayoría de los países mediterráneos, las personas diagnosticadas con trastornos mentales graves (TMG) suelen ser atendidas por la madre, lo que supone una carga importante para las personas que desempeñan este rol familiar. A partir de una investigación cualitativa y de acción participativa en salud mental llevada a cabo en Cataluña (España) de 12 entrevistas en profundidad y 3 grupos focales, este artículo analiza la experiencia de la madre-cuidadora en el espacio doméstico. Los resultados

	muestran que pacientes y cuidadores están inmersos en una relación de "dependencias anidadas", que crean aislamiento social. Esto produce las condiciones de un "cuidado reaccionario", prácticas que limitan la autonomía de los afectados y que reproducen formas de instituciones psiquiátricas disciplinarias.
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Título	Sociodemographic factors as moderators of COVID-19 stress on depression
Autoría	Kenneth G Rice, Michelle Aiello, Barbara Durán, Jeffrey S Ashby, Ibrahim Kira
Publicación	Anxiety Stress Coping. 2023 Jan;36(1):110-123.
Resumen/Objetivo	Antecedentes y objetivos: La pandemia de COVID-19 ha perturbado muchos aspectos de la vida cotidiana, pero se sabe relativamente poco sobre el estrés relacionado con la COVID-19 en subgrupos de la población. Examinamos las diferencias en el estrés por COVID y la depresión en función del sexo, la raza, la etnia y el estatus social subjetivo. Probamos estos factores como moderadores de la asociación entre COVID-estrés y depresión.

Título	Explorando el enfoque dialógico en el abordaje de las enfermedades psicóticas: Una revisión sistemática
Autoría	Aitana Fernández-Villardón, Rocío García-Carrión, Sandra Racionero-Plaza.
Publicación	An. psicol ; 38(3): [419-429], Oct-Dic. 2022. tab, graf
Resumen/Objetivo	Esta revisión pretende analizar el impacto clínico y social de las intervenciones psicológicas basadas en principios dialógicos en pacientes con psicosis.

Título	Outcomes frequently specified in Cochrane reviews of community-based psychosocial interventions for adults with severe mental illness: A systematic search and narrative synthesis
Autoría	Momoka Igarashi, Sosei Yamaguchi, Takayuki Kawaguchi, Makoto Ogawa, Sayaka Sato, Chiyo Fujii
Publicación	Neuropsychopharmacol Rep. 2021 Dec;41(4):459-463.
Resumen/Objetivo	La selección de resultados en los estudios de intervención es una cuestión crítica para sintetizar la evidencia. Este estudio tiene como objetivo investigar los resultados utilizados en las revisiones Cochrane que evalúan las intervenciones psicosociales basadas en la comunidad para adultos con enfermedades mentales graves.

OTROS RECURSOS DE INTERÉS

Título	Resources for Families Coping with Mental and Substance Use Disorders
Autoría	Substance Abuse and Mental Health Services Administration
Publicación	Substance Abuse and Mental Health Services Administration, Mar 2023
Resumen/Objetivo	<p>Cada familia es única, pero todas comparten un vínculo que puede utilizarse para apoyarse mutuamente en los momentos difíciles. Aunque no existe una solución única para ayudar a un familiar que bebe demasiado, consume drogas o padece una enfermedad mental, las investigaciones demuestran que el apoyo familiar puede desempeñar un papel fundamental a la hora de ayudar a un ser querido con trastornos mentales o por consumo de sustancias.</p> <p>Página web con archivos de audio, vídeo y otros recursos para las familias.</p>

Título	Mental health and loneliness: the relationship across life stages [Research and analysis]
Autoría	Gov.UK
Publicación	Gov.UK, 2022 June
Resumen/Objetivo	<p>Este informe presenta los resultados de un estudio cualitativo que explora las experiencias de soledad entre quienes han padecido una enfermedad mental. Investigaciones anteriores han demostrado que existe un vínculo entre las experiencias de soledad y la mala salud mental. El Departamento de Digital, Cultura, Medios de Comunicación y Deporte (DCMD) encargó este estudio para explorar este tema a través de cuatro etapas clave de la vida como parte del desarrollo de la base de pruebas para el trabajo en la lucha contra la soledad.</p>

Título	Health at a Glance: Europe 2022: State of Health in the EU Cycle
Autoría	OECD / European Union
Publicación	OECD / European Union, 2022
Resumen/Objetivo	<p>Reforzar la resiliencia de los sistemas sanitarios, la preparación ante las crisis y la capacidad de respuesta mediante de respuesta</p>

	mediante inversiones específicas; Promover una mejor prevención y tratamiento del cáncer y otras enfermedades no transmisibles; Prevenir y abordar los problemas de salud mental tras la pandemia y en el actual contexto de crisis múltiples; Apoyar la transformación digital de los sistemas de salud para aprovechar al máximo los datos sanitarios y las nuevas herramientas digitales; Reconocer la importancia de los esfuerzos regionales, nacionales, europeos e internacionales para hacer frente a las amenazas mundiales para la salud pública.
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Título	Salud mental
Autoría	Consejo Europeo y Consejo de la Unión Europea.
Publicación	Secretaría General del Consejo, el órgano administrativo encargado de asistir al Consejo de la UE y al Consejo Europeo.
Resumen/Objetivo	La salud mental es clave para una vida plena y productiva. Sin embargo, muchos europeos tienen problemas de salud mental. Los países de la UE se esfuerzan por promover mejor la salud mental.

Estrategia de búsqueda de literatura científica

Búsquedas concretas en las bases de datos	
Pubmed	1) "Psychosocial intervention" AND severe mental disorder NOT Alzheimer NOT autism NOT dementia AND (outcomes OR impact). 2) (epidemiology AND sociodemographic variables) AND (severe mental disorder OR SMD) NOT alzheimer NOT autism NOT dementia AND Spain. 3) "family role" AND (severe mental disorder OR SMD) NOT dementia NOT alzheimer NOT autism NOT cancer.
WoS	1) "psychosocial" intervention AND severe mental disorder NOT Alzheimer NOT autism NOT dementia AND (outcomes OR impact). 2) (epidemiology AND sociodemographic variables) AND (severe mental disorder OR SMD) NOT alzheimer NOT autism NOT dementia. 3) "family role" AND (severe mental disorder OR SMD) NOT dementia NOT alzheimer NOT autism NOT cancer

Bases de datos	Pubmed	WoS
Filtros aplicados: <ul style="list-style-type: none"> Publicación: 1) 2022-2024 Publicación: 2) y 3) 2019-2024 	195 / 166 / 13	261 / 139 / 4
Filtros aplicados en Pubmed 1) <ul style="list-style-type: none"> Tipo de documento: Metaanálisis, Revisión sistemática. Especies: Humana. Excluir: preprints. Acceso: Abierto. 2) y 3) <ul style="list-style-type: none"> Tipo de documento: Metaanálisis, Revisión sistemática, Revisión, Ensayo aleatorio controlado, ensayo clínico. Especies: Humana. 	38 / 2 / 1	-

<ul style="list-style-type: none"> • Excluir: preprints. • Acceso: Abierto. 		
<p>Filtros aplicados en WoS</p> <p>1) Y 2)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Colección WoS: Colección Principal. • Tipo de documento: revisión sistemática. • Área de investigación: Psicología; Psiquiatría; Salud pública, medioambiental y laboral; Ciencias del comportamiento. • Acceso: Abierto. <p>3)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Colección WoS: Colección Principal. • Acceso: Abierto. 	-	31 / 2 / 2

Se seleccionan los artículos de las revistas indexadas en cuartil 1 y 2 (Q1, Q2)

Criterios de inclusión:

- Muestra: personas adultas.
- Diagnósticos: diagnóstico psiquiátrico – trastorno mental grave.
- Intervenciones: psicosociales.
- Objetivos adicionales: estudiar variables sociodemográficas u otros aspectos relacionados con la mejora de la calidad de vida, estudiar el rol de la familia en la salud mental.

<p>Total de registros incluidos</p> <p>En esta fase siguiente a la búsqueda principal:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se eliminan duplicados, • Se añaden otros registros relacionados por la propia BBDD que no tienen porque ser revisiones sistemáticas o metaanálisis, • Se añaden registros citados, • Se revisa la biblioteca Cochrane. 	31
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE DERECHOS SOCIALES, CONSUMO
Y AGENDA 2030

SECRETARÍA DE ESTADO
DE DERECHOS SOCIALES



CREAP

Centro de
Referencia
Estatad de
Atención
Psicosocial

<https://creap.imserso.es>